

予防接種カレンダー

(平成28年10月1日現在)

種類	ワクチン	受ける回数	標準的な時期	乳児期			幼児期			学童期														
				2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	12 か月	15 か月	18 か月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳~	
定期接種	インフルエンザ菌b型(Hib)	計4回/初回は27~56日間隔で3回、その後7~13か月おいて追加1回	初回は生後2~7か月	①	②	③				④														
	小児用肺炎球菌	計4回/初回は27日以上の間隔で3回、その後60日以上おいて追加1回	初回は生後2~7か月	①	②	③				④														
	B型肝炎(HBV)	計3回/27日以上の間隔をあけて2回、その後1回目から139日以上あけて1回接種	生後2~9か月未満	①	②				③															平成28年4月以降に出生した子が対象
	四種混合(DPT-IPV) ジフテリア:D 百日せき:P 破傷風:T ポリオ:IPV	計4回/1回~3回の間はそれぞれ20~56日(3~8週間)あける 3回目の後は1年~1年6か月後に1回接種	生後3か月~1歳に 最初の3回を		①	②	③					④												
	BCG	1回	生後5~8か月未満				①																	
	麻疹、風しん(MR)	2回/1回目は1歳以上2歳未満、2回目は5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間	1歳になったらできるだけ早く受けましょう!								①					②								
	水痘(水ぼうそう)	計2回/1~2歳に3か月以上の間隔をあけて2回	初回は1歳~1歳3か月未満								①	②												
	日本脳炎	1期:6日~28日間隔で2回	3歳																					
		1期追加:初回終了後、おおむね1年後に1回 2期:1回	4歳 9歳									① ②	③									④ 2期9~12歳		
	二種混合(DT)	1回	11歳																				①	2期:11~12歳
ヒトパピローウイルス(HPV)	計3回*女子のみ	13歳となる日の属する年度の初日~末日まで																					①②③ 13~14歳	
任意接種	ロタウイルス	1価(2回接種)と5価(3回接種)の2種類、いずれも1回目は生後14週+6日までが推奨	①②③ 1価は生後24週未満まで、5価は生後32週未満までに完了する	①	②	③																		
	おたふくかぜ	1回 保育所など集団生活に入る子は早めに受けるとよいでしょう								①						②							(注)予防効果を確実にするために2回接種	
	インフルエンザ	13歳未満は2回(2~4週間隔)																					毎年①②(10月、11月などに) ①13歳からは1回	

● 予防接種のくわしい情報は国立感染症研究所/予防接種スケジュール <http://www.nih.go.jp/niid/ja/schedule.html>
 ● 任意接種については日本小児科学会「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」を参照 <http://www.jpeds.or.jp/>

■ は望ましい時期の例、①②などの数字はワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、市区町村の予防接種担当窓口、かかりつけ小児科医に相談しましょう。予防接種は法令等で変更になることがあります。